


## บทที่ 4

### การประมาณค่าในช่วง

การใช้งานข้อมูลสำรวจระยะไกลมีความนิยมอย่างมากสำหรับงานทางด้านภูมิสารสนเทศในปัจุบัน ก่อนการนำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมไปใช้ประโยชน์ มีความจำเป็นต้องปรับแก้เชิงเรขาคณิตเพื่อลดข้อบกพร่องทางเครื่องรับสัญญาณและรูปลักษณะของวัตถุ ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญคือการประมาณค่าของจุดภาพ หรือค่าความสว่างของจุดภาพใหม่ วิธีการที่ใช้ได้แก่ การประมาณค่าจากตำแหน่งใกล้สุด (Nearest neighbor interpolation) การประมาณค่าแบบเส้นคู่ (Bi-linear interpolation) และการประมาณค่าแบบการประสานเชิงลูกบาศก์ (Cubic convolution interpolation) หลังการปรับแก้ค่าความสว่างจะทำให้ข้อมูลเกิดความเรียบต่อเนื่อง แต่อาจมีรายละเอียดลดลงจากข้อมูลภาพเริ่มต้น



รูปที่ 4.1 : พื้นผิวที่ผ่านกระบวนการคำนวณค่าความสว่างของจุดภาพใหม่

การปรับค่าของจุดภาพข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้การประมาณค่าในช่วงซึ่งเราจะกล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวในบทนี้ การประมาณค่าในช่วง (interpolation) เป็นกระบวนการสร้างพหุนามที่มีกราฟผ่านข้อมูลที่กำหนด

ถ้ามีข้อมูลตัวเลขมาชุดหนึ่ง (อาจมาจากการวัดหรือการทดลอง) ต้องการทราบค่าอื่นที่ไม่ได้ทำการวัดในช่วงที่วัดข้างต้น จะประมาณค่าเหล่านั้นขึ้นมา โดยการประมาณค่านั้นจะสมมุติว่า พฤติกรรมของข้อมูลที่ได้สามารถประมาณได้ด้วยฟังก์ชันพหุนาม เรียกการประมาณค่านี้ว่า การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) ถ้าจำนวนข้อมูลที่วัดได้มีมากพอจะทำให้การประมาณฟังก์ชันพหุนามใกล้เคียงกับพฤติกรรมของฟังก์ชันจริงที่เป็นตัวแทนของข้อมูล และทำให้การประมาณค่าข้อมูลค่าอื่นที่ไม่ได้ทำการวัดมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ควรจะเกิดขึ้นจริง ๆ

#### 4.1 พหุนามลากrang (Lagrange Polynomial)

ถ้าทราบจุดข้อมูล 2 จุดคือ  $(x_0, f(x_0))$  และ  $(x_1, f(x_1))$  ต้องการหาพหุนาม ดีกรีหนึ่ง  $p_1(x)$  (คือเส้นตรง) ที่ผ่านทั้งสองจุด จะได้สมการเส้นตรงที่ผ่านจุดทั้งสองคือ

$$p(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

เมื่อ  $x = x_0$  จะได้

$$\begin{aligned} p_1(x_0) &= \frac{x_0 - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x_0 - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1) \\ &= f(x_0) \end{aligned}$$

เมื่อ  $x = x_1$  จะได้

$$\begin{aligned} p_1(x_1) &= \frac{x_1 - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x_1 - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1) \\ &= f(x_1) \end{aligned}$$

จะได้พหุนาม  $p_1(x)$  ที่มีสมบัติตามต้องการ

ถ้ากำหนดให้  $L_{1,0}(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}$  และ  $L_{1,1}(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$  จะได้ว่า

$$p_1(x) = L_{1,0}(x)f(x_0) + L_{1,1}(x)f(x_1)$$

ถ้าทราบจุดข้อมูล 3 จุดคือ  $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1))$  และ  $(x_2, f(x_2))$  และจะสร้างพหุนาม ดีกรี 2 ที่ผ่านทั้งสามจุดได้คือ

$$p_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2)$$

ถ้ากำหนดให้  $L_{2,0}(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$ ,  $L_{2,1}(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$

และ  $L_{2,2}(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$  จะได้ว่า

$$p_2(x) = L_{2,0}(x)f(x_0) + L_{2,1}(x)f(x_1) + L_{2,2}(x)f(x_2)$$

ทำนองเดียวกันเมื่อทราบข้อมูล  $n + 1$  จะสามารถสร้างพหุนามดีกรี  $n$  ได้ดังนี้

นิยาม 4.1 พหุนามลAGRONG (Lagrange Polynomial) อันดับ  $n$  คือ

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n L_{n,k}(x)f(x_k)$$

၁၅

$$L_{n,k}(x) = \frac{\prod_{j=0, j \neq k}^n (x - x_j)}{\prod_{j=0, j \neq k}^n (x_k - x_j)}$$

#### ตัวอย่าง 4.1 กำหนดชุดข้อมูลดังตาราง

$x$	4.1	6.1
$f(x)$	7.1	2.3

จงหาพหุนามที่ประมานค่าในช่วงของชุดข้อมูลในตารางข้างต้นพร้อมทั้งหา ค่าประมานของ  $f(5)$

#### ตัวอย่าง 4.2 กำหนดชุดข้อมูลดังตาราง

$x$	2	2.5	4
$f(x)$	0.5	0.4	0.25

จงหาพหุนามที่ใช้ประมาณค่าในช่วงของชุดข้อมูลข้างต้นพร้อมทั้งหา ค่าประมาณของ  $f(3)$

ตัวอย่าง 4.3 จงคำนวณค่าของ  $\ln 9.2$  โดยสร้างพหุนามลากrang จำก

$$\ln 9.0 = 2.1972, \ln 9.5 = 2.2513 \text{ และ } \ln 10.0 = 2.3026$$

#### ตัวอย่าง 4.4 กำหนดชุดข้อมูลดังตาราง

$x$	1	2.5	4	5.5	7
$y$	0	0.916	1.386	1.705	1.950

จงหาพหุนามดีที่ใช้ประมาณค่าในช่วงของชุดข้อมูลข้างต้นพร้อมทั้งหาค่าประมาณของ  $y$  ที่  $x = 6$

ตัวอย่าง 4.5 กำหนดชุดข้อมูลดังตาราง

$x$	1	2	3	4	5	6
$y$	3.31	18.28	57.97	134.44	259.75	445.96

จงหาพหุนามดีที่ใช้ประมาณค่าในช่วงของชุดข้อมูลข้างต้นพร้อมทั้งหาค่าประมาณของ  $y$  ที่  $x = 4.5$

## 4.2 การประมาณค่าในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างย่อของนิวตัน (Newton's divided difference interpolating polynomials)

กำหนดให้  $p_n(x)$  เป็นพหุนามประมาณค่าดีกรี  $n$  ของฟังก์ชัน  $f$  ที่แต่ละจุด  $x_0, x_1, \dots, x_n$  และสมมติให้  $p_n(x)$  อยู่ในรูป

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{n-1})$$

โดยที่  $p_n(x_i) = f(x_i), i = 0, 1, 2, \dots, n$

ถ้าทราบ  $a_0, a_1, \dots, a_n$  เราจะได้  $p_n(x)$  สำหรับประมาณ  $f$  ที่ต้องการ

พิจารณาหาค่า  $a_0$

จาก  $p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{n-1})$

แทน  $x = x_0$  จะได้  $p_n(x_0) = a_0$

และจาก  $p_n(x_0) = f(x_0)$  จะได้

$$a_0 = f(x_0)$$

แทนค่า  $a_0$  จะได้

$$p_n(x) = f(x_0) + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{n-1})$$

พิจารณาหาค่า  $a_1$

แทน  $x = x_1$  จะได้  $p_n(x_1) = f(x_0) + a_1(x_1 - x_0)$

และจาก  $p_n(x_1) = f(x_1)$  จะได้

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_0) + a_1(x_1 - x_0) \\ a_1 &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)} \end{aligned}$$

แทนค่า  $a_0$  และ  $a_1$  จะได้

$$p_n(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)}(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{n-1})$$

พิจารณาหาค่า  $a_2$

แทน  $x = x_2$  จะได้  $p_n(x_2) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)}(x - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$

และจาก  $p_n(x_2) = f(x_2)$  จะได้

$$\begin{aligned} f(x_2) &= f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)}(x - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) \\ a_2 &= \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{(x_2 - x_1)} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)}}{x_2 - x_0} \end{aligned}$$

พิจารณาความสัมพันธ์  $a_0, a_1$  และ  $a_2$

$$\begin{aligned} a_0 &= f(x_0) \\ a_1 &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)} \\ a_2 &= \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{(x_2 - x_1)} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)}}{x_2 - x_0} \end{aligned}$$

นิยามสัญลักษณ์ผลต่างยอด

ผลต่างยอดอันดับที่ 0 แทนด้วย  $f[x_i] = f(x_i)$

ผลต่างยอดอันดับที่ 1 แทนด้วย  $f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}$

ผลต่างยอดอันดับที่  $k$  แทนด้วย  $f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$

จากนิยามจะเห็นว่า

$$\begin{aligned} a_0 &= f[x_0] \\ a_1 &= f[x_0, x_1] \\ &\vdots \\ a_n &= f[x_0, x_1, \dots, x_n] \end{aligned}$$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned} p_n(x) &= a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) \\ &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + \\ &\quad f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1}) \\ &= f[x_0] + \left( \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1}) \right) \end{aligned}$$

เราสามารถเขียนสูตรการประมาณค่าในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างยอดของนิวตัน ให้อยู่ในรูปของตารางเพื่อสะดวกในการคำนวณได้ดังนี้

$i$	$x_i$	$f(x_i)$	อันดับ 0	อันดับ 1	อันดับ 2	...	อันดับ $n$
0	$x_0$	$f(x_0)$	$f[x_0]$				
				$f[x_0, x_1]$			
1	$x_1$	$f(x_1)$	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$		
				$f[x_1, x_2]$			
2	$x_2$	$f(x_2)$	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3]$		
				$f[x_2, x_3]$			
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$f[x_0, x_1, \dots, x_n]$
				$f[x_{n-2}, x_{n-1}]$			
$n-1$	$x_{n-1}$	$f(x_{n-1})$	$f[x_{n-1}]$		$f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$		
				$f[x_{n-1}, x_n]$			
$n$	$x_n$	$f(x_n)$	$f[x_n]$				

ตัวอย่าง 4.6 จงประมาณค่าภายในช่วงที่  $x = 5$  โดยใช้ระเบียบวิธีผลต่างย่อของนิวตัน เมื่อกำหนดข้อมูลดังตาราง

$x$	4.1	6.1
$f(x)$	7.1	2.3

ตัวอย่าง 4.7 จงประมาณค่าภายในช่วงที่  $x = 3$  โดยใช้ระเบียบวิธีผลต่างย่อของนิวตัน เมื่อกำหนดข้อมูลดังตาราง

$x$	2	2.5	4
$f(x)$	0.5	0.4	0.25

ตัวอย่าง 4.8 จงประมาณค่าภายในช่วงที่  $x = 6$  โดยใช้ระเบียบวิธีผลต่างย่อของนิวตัน เมื่อกำหนดข้อมูลดังตาราง

$x$	1	2.5	4.1	5.5	7
$y$	0	0.916	1.386	1.705	1.950